

ABSTRAK

GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANTIRETROVIRAL DENGAN METODE ATC/DDD DI PUSKESMAS KOTA KEDIRI 2021

Oleh : Dandi Fathor Rozy P.S

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) yaitu kumpulan gejala dan infeksi yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia, HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yaitu virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh pada manusia. Pasien ODHA harus menjalani terapi obat antiretroviralvirus (ARV), sistem klasifikasi analisis penggunaan obat salah satunya adalah menggunakan sistem ATC/DDD adalah sarana untuk meneliti penggunaan obat dalam berupaya untuk peningkatan kualitas penggunaan obat, salah satu komponen ini adalah presentasi dan perbandingan dari konsumsi obat tingkat internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan konsumsi obat antiretroviral di puskesmas pada wilayah Kota Kediri periode 2021 dengan menggunakan metode ATC/DDD. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan suatu kejadian tertentu secara sistematis dan akurat serta perlakuan penelitian ini adalah proses pengumpulan data dan evaluasi tentang penggunaan obat antiretroviral serta verifikasi data puskesmas dengan wawancara terhadap apoteker puskesmas di wilayah kota kediri tahun 2021. Konsumsi obat antiretroviral (ARV) terbanyak pada puskesmas campurejo yaitu Lamivudine (3TC) sebanyak 31,71%, puskesmas balowerti dengan Zidovudine (AZT) sebanyak 29,02% dan puskesmas pesantren 1 dengan obat Nevirapine (NVP) sebanyak 32,62% sedangkan untuk obat ARV yang sedikit penggunaanya di puskesmas campurejo adalah obat Dolutegravir (DTG) sebanyak 0,0002% dan puskesmas balowerti dengan obat Dolutegravir (DTG) sebanyak 0,0012% lalu dengan puskesmas pesantren 1 dengan obat Dolutegravir (DTG) sebanyak 0,0015%. Masih tingginya angka kejadian penyakit HIV di indonesia khususnya di kota kediri.

Kata Kunci: HIV/AIDS,Antiretroviral,ATC/DDD

ABSTRACT

DESCRIPTION OF THE USAGE OF ANTIRETROVIRAL MEDICINE WITH ATC/DDD METHOD IN THE PRIMARY HEALTH CARE CENTERS OF KEDIRI 2021

Oleh : Dandi Fathor Rozy P.S

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is a collection of symptoms and infections caused by damage to the human immune system, HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a virus that can weaken immunity in humans. PLHIV patients must undergo antiretroviral drug therapy (ARV), one of the classification systems for analyzing drug use is using the ATC/DDD system, which is a means for researching drug use in an effort to improve the quality of drug use, one of these components is presentation and comparison of drug consumption levels. International. The purpose of this study is to determine the use of antiretroviral drug consumption in primary health care centers in the City of Kediri for the 2021 period using the ATC/DDD method. This study uses a quantitative descriptive research design, which describes a certain event systematically and accurately and the treatment of this research is the process of collecting data and evaluating the use of antiretroviral drugs and verifying primary health care center data by interviewing primary health care center pharmacists in urban areas kediri in 2021. The highest consumption of antiretroviral drugs (ARV) in the primary health care center in Campurejo, namely Lamivudine (3TC) as much as 31.71%, primary health care center balowerti with Zidovudine (AZT) as much as 29.02% and primary health care center pesantren 1 with drugs Nevirapine (NVP) was 32.62%, while for ARV drugs that were little used in the primary health care center in Campurejo were the drug Dolutegravir (DTG) of 0.0002% and the balowerti primary health care center with the drug Dolutegravir (DTG) of 0.0012%. then with the primary health care center pesantren 1 with the drug Dolutegravir (DTG) as much as 0.0015%. There is still a high incidence of HIV disease in Indonesia, especially in the city of Kediri.

Keywords: HIV/AIDS,Antiretroviral,ATC/DDD