

**PERBEDAAN KEMAMPUAN AKTIVITAS SEHARI-HARI PADA
PASIEN *POST SECTIO CAESAREA* METODE *ERACS* DAN
KONVENSIONAL
DI RS ELIZABETH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Irta Diah Kumalasari¹, Shanty Natalia²

*Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan,
Universitas STRADA Indonesia
Email : irtadiahkumalasari@gmail.com*

ABSTRAK

Latar belakang : Kemajuan ilmu pengetahuan mendukung adanya beberapa penemuan baru yang berkaitan dengan dunia medis, salah satu di antaranya adalah pada bidang obstetri dan ginekologi, yaitu terbukanya peluang bagi ibu hamil untuk menentukan pilihan jenis persalinan; dengan cara pervaginam atau dengan tindakan *sectio caesarea* (SC).

Metode : Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analitik *Observasional*, yaitu Rancangan penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara metode Eracs dan Konvensional secara observasional dengan populasi sebanyak 105 responden dan sampel sebanyak 60 responden menggunakan purposive sampling. Variabel Independen kemampuan aktivitas sehari-hari, Variabel Dependen Pasien *Post Sectio Caesarea* Metode *Eracs* dan Konvensional menggunakan Uji Statistik *T-Test*.

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden mengalami Ketergantungan Sedang dengan jumlah lebih kecil yaitu sebanyak 16 responden (53,3%). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden mengalami Ketergantungan Sedang dengan jumlah lebih kecil yaitu sebanyak 16 responden (53,3%)

Analisis : Berdasarkan hasil analisis uji independent T-test menunjukkan nilai sig atau p-value sebesar 0,001 yang berarti nilai p-value < 0,05. Apabila nilai p-value < 0,05; maka terdapat perbedaan pada aktivitas sehari-hari pada pasien *Post Sectio Caesarea* dengan metode *eracs* dan konvensional

Kesimpulan : maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas sehari-hari pasien *Post Sectio Caesarea* dengan metode *Eracs* dan Konvensional di RS Elizabeth Situbondo Jawa Timur.

Kata Kunci: *Post Sectio Caesarea, Eracs, Non Eracs*

**DIFFERENCES IN DAILY ACTIVITY ABILITY IN POST SECTIO
CAESAREA PATIENTS WITH ERACS AND CONVENTIONAL METHODS
AT ELIZABETH HOSPITAL SITUBONDO EAST JAVA**

Irta Diah Kumalasari¹, Shanty Natalia²

*S1 Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Midwifery,
STRADA Indonesia University
Email: irtadiahkumalasari@gmail.com*

ABSTRACT

Introduction: *Advances in science support several new discoveries related to the medical world, one of which is in the field of obstetrics and gynecology, namely the opening of opportunities for pregnant women to determine the choice of type of delivery; by vaginal or by sectio caesarea (SC).*

Method: *This type of research is This research uses the Observational Analytical research method, namely the research design used to determine the causal relationship between the Eracs and Conventional methods observationally with a population of 105 respondents and a sample of 60 respondents using purposive sampling. Independent Variables of daily activity abilities, Dependent Variables of Post Sectio Caesarea Patients Eracs and Conventional Methods using the T-Test Statistical Test.*

Results: *Based on the results of this study, it shows that most respondents experience Moderate Dependence with a smaller number of 16 respondents (53.3%). Based on the results of this study, it shows that most respondents experience Moderate Dependence with a smaller number of 16 respondents (53.3%)*

Analysis: *Based on the results of the independent T-test analysis, the sig value or p-value is 0.001, which means the p-value is <0.05. If the p-value is <0.05; then there is a difference in daily activities in Post Sectio Caesarea patients with the Eracs and conventional methods*

Discuss: *it can be concluded that there is a significant difference in the daily activities of Post Sectio Caesarea patients with the Eracs and Conventional methods at Elizabeth Hospital Situbondo, East Java.*

Keywords: *Post Sectio Caesarea, Eracs, Non Eracs*