

ABSTRAK
RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN DIARE DI UPT
PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA
KOTA KEDIRI

Nova Rosniati Djami, Hanie Kusuma Wardani

Universitas STRADA Indonesia

email: novadjami27@gmail.com

Penyalahgunaan dalam penggunaan jenis obat, dosis atau durasi terapi yang tidak sesuai pedoman klinis (tidak rasional) dengan pedoman terapi, akan meningkatkan berkembangnya resistensi bakteri terhadap antibiotik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi rasionalitas penggunaan Obat pada pasien diare di UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel sebanyak 132 data rekam medis berdasarkan kriteria inklusi dan eskklusi. Data yang diperoleh dapat dibandingkan dengan kemenkes RI 2022 tentang panduan praktek klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas penggunaan obat pada pasien diare di UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri yaitu tepat indikasi sebesar 90%, tepat pemilihan obat sebesar 90%, tepat interval waktu pemberian 100%, tepat dosis 100%, dan tepat penilaian kondisi pasien 100%. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa rasionalitas penggunaan obat pada pasien diare sesuai data rekam medis diketahui seluruh responden dalam kategori rasional. Diharapkan agar perlu dilakukan perbaikan kelengkapan dan kejelasan dalam penulisan data-data yang tercantum dalam rekam medik agar pihak yang berkepentingan dapat lebih mudah mendapatkan data yang lengkap.

Kata Kunci : Obat, Diare, Pasien, Rasionalitas

ABSTRACT
RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN DIARE DI UPT
PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA
KOTA KEDIRI

Nova Rosniati Djami, Hanie Kusuma Wardani

Universitas STRADA Indonesia

email: novadjami27@gmail.com

Abuse in the use of drug types, doses or duration of therapy that is not in accordance with clinical guidelines (irrational) with therapeutic guidelines, will increase the development of bacterial resistance to antibiotics. The purpose of this study was to evaluate the rationality of drug use in diarrhea patients at the North Region of Kediri City primary healthcare centre. This research design is descriptive with a cross sectional approach. The sample was 132 medical record data based on inclusion and exclusion criteria. The results showed that the rationality of drug use in diarrhea patients at the North Region of Kediri City primary healthcare centre was the right indication by 90%, the right drug selection by 90%, the right time interval for administration 100%, the right dose 100%, and the right assessment of the patient's condition 100%. Based on the results of the study, it is concluded that the rationality of drug use in diarrhea patients according to medical record data is known to all respondents in the rational category. It is hoped that it is necessary to improve the completeness and clarity of writing the data contained in the medical record so that interested parties can more easily obtain complete data.

Keywords : Drugs, Diarrhea, Patients, Rationality