

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA ULKUS DEKUBITUS PADA PASIEN YANG DI RAWAT DI RUANG ICU RUMAH SAKIT DIAN HARAPAN

Oleh : Anselmus Ama Sabon

Ulkus decubitus merupakan komplikasi serius yang sering terjadi pada pasien yang mengalami perawatan intensif di ruang ICU. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, durasi rawat inap yang lebih lama serta biaya perawatan perawatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian ulkus decubitus pada pasien di ICU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ulkus decubitus pada pasien yang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Dian Harapan khususnya usia, nutrisi, mobilisasi dan lama perawatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional dengan jumlah populasi 30 orang dan jumlah sampel 30 responden didapatkan dengan teknik total sampling. Instrumen menggunakan kuesioner dan lembar observasi dengan menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS (statistic descriptive, uji chi-square dan regresi logistic). Variable yang dianalisis meliputi usia, nutrisi, mobilisasi dan lama perawatan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan kejadian decubitus dengan p value 0,365(0,05). Tidak ada hubungan antara nutrisi dengan kejadian decubitus dengan nilai p value 0,752(0,05). Ada hubungan antara mobilisasi dengan kejadian decubitus dengan nilai p value 0,04(0,05). Ada hubungan antara lama perawatan dengan kejadian decubitus dengan nilai p value 0,00(0,05). Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian decubitus yakni variable mobilisasi dengan odd ratio sebesar 2,608 dan nilai sig p value sebesar 0,326 dan lama perawatan dengan add ratio sebesar 1,007 dan nilai sig p value sebesar 0,999. Mobilisasi dan lama perawatan memiliki peran yang sangat signifikan dalam terjadinya ulkus decubitus pada pasien di ICU. Oleh karena itu diperlukan Upaya pencegahan melalui peningkatan mobilisasi dan pengelolaan durasi perawatan yang optimal untuk menekan kejadian ulkus decubitus.

Kata kunci : ulkus decubitus, ICU, usia, nutrisi, mobilisasi, lama perawatan

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE OCCURRENCE OF DECUBITUS ULCERS IN PATIENTS WHO ARE TREATED IN THE ICU ROOM OF DIAN HARAPAN HOSPITAL

By : Anselmus Ama Sabon

Decubitus ulcer is a serious complication that often occurs in patients who are undergoing intensive care in the ICU room. This condition can lead to increased morbidity, longer duration of hospitalization, and higher treatment costs. It is therefore important to understand the factors that contribute to the incidence of decubitus ulcers in patients in the ICU. This study aims to analyze the factors that affect the occurrence of decubitus ulcers in patients treated in the ICU room of Dian Harapan Hospital, especially age, nutrition, mobilization and duration of treatment. This study uses a cross-sectional approach with a total number of respondents of 30 respondents obtained by total sampling technique. The instrument used questionnaires and observation sheets by analyzing data using SPSS (statistic descriptive, chi-square test and logistic regression) applications. The variables analyzed included age, nutrition, mobilization and duration of treatment. The results of the study found that there was no relationship between age and the incidence of decubitus with a p value of 0.365(0.05). There was no relationship between nutrition and the incidence of decubitus with a p value of 0.752(0.05). There was a relationship between mobilization and the incidence of decubitus with a p value of 0.04(0.05). There was a relationship between the length of treatment and the incidence of decubitus with a p value of 0.00(0.05). The factors that affect the incidence of decubitus are variable mobilization with an odd ratio of 2.608 and a sig p value of 0.326 and the duration of treatment with an add ratio of 1.007 and a sig p value of 0.999. Mobilization and duration of treatment have a very significant role in the occurrence of decubitus ulcers in patients in the ICU. Therefore, preventive efforts are needed through increased mobilization and management of optimal treatment duration to suppress the incidence of decubitus ulcers.

Keywords: decubitus ulcer, ICU, age, nutrition, mobilization, length of treatment